

	<h2 style="text-align: center;">HYGIENIC BF PLUS</h2> <h3 style="text-align: center;">DETERGENTE DESINFETANTE CONCENTRADO BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA CONTRA VÍRUS COM ENVELOPE</h3>
<p style="text-align: center;"><b>DESCRIÇÃO</b></p>	<p>Detergente desinfetante concentrado, à base de Cloreto de Didecildimetilamónio recomendado para limpeza e desinfeção de superfícies não porosas em diversas áreas, tais como, área hospitalar, centros de saúde, áreas institucionais (TP2), e para a desinfeção de superfícies e utensílios na área alimentar e também outras áreas relacionadas, tais como cozinhas, peixarias, talhos, <i>catering</i>, padarias, charcutarias, restauração (TP4).</p>
<p style="text-align: center;"><b>PROPRIEDADES</b></p>	<p>Contém um amplo espectro de atividade contra bactérias, fungos, leveduras e vírus com envelope (<b>ver anexo I</b>).</p> <p>Adequado para superfícies suscetíveis de entrar em contacto com alimentos.</p> <p>Elevado poder detergente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ÁREAS DE APLICAÇÃO</b></p>	<p><b>Áreas críticas na indústria alimentar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INDÚSTRIA DE BEBIDAS REFRESCANTES E ÁGUAS MINERAIS: Desinfeção de tanques de mistura, pasteurizadores, enchedoras, condutas e elementos desmontáveis.</li> <li>• INDÚSTRIA LÁCTEA: Desinfeção de pasteurizadores, enchedoras, centrífugas e tanques de coalhada.</li> <li>• INDÚSTRIA DE GELADOS: Desinfeção de pasteurizadores, freezers, tanques de mistura de ingredientes, enchedoras, etc.</li> <li>• INDÚSTRIA VINÍCOLA: Desinfeção de tanques de guarda e fermentação, enchedoras de garrafas.</li> <li>• INDÚSTRIA DE CARNES: Para manter assépticas as superfícies que tenham sido lavadas previamente. Utensílios de sacrifício (por imersão).</li> </ul> <p>Igualmente recomendado para a desinfeção de superfícies e utensílios em cozinhas, peixarias, talhos, <i>catering</i>, padarias, charcutarias, restauração.</p> <p>Área institucional: escolas, infantários, escritórios, ginásios, lares.</p> <p>Área hospitalar e áreas relacionadas: centros de saúde, indústria farmacêutica.</p> <p>Áreas profissionais: Transportes públicos, cabeleireiras, centros estéticos.</p>
<p style="text-align: center;"><b>MODO DE EMPREGO</b></p>	<p>Aplicar o produto diluído lavar e esfregar (ação mecânica) com pano ou equivalente humedecido. Sem ação mecânica, pulverizar o produto diluído nas superfícies e/ou imergir os equipamentos e ferramentas com o produto.</p> <p>Ação bactericida e leveduricida, diluir 5% do produto em água (50mL por litro de água) e deixar atuar durante 5 minutos. Enxaguar com água potável no fim.</p> <p>Ação fungicida, diluir 15% do produto em água (150mL por litro de água) e deixar atuar durante 15 minutos. Enxaguar com água potável no fim.</p>

	<p>Ação virucida contra vírus com envelope, diluir 2,50% do produto em água (25mL por litro de água) e deixar atuar durante 1 minuto. Enxaguar com água potável no fim.</p> <p>Para uma desinfecção mais localizada de superfícies e equipamentos o produto pode ser aplicado na sua forma pura (sem diluição). Enxaguamento final com água potável.</p>
<b>HIGIENE E SEGURANÇA</b>	<p>Ver Ficha Dados Segurança do Produto.</p> <p>Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas.</p> <p>Em caso de acidente, consultar o <b>Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 800 250 250.</b></p>
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<p><b>Estado físico</b> a 20°C: Líquido</p> <p><b>Aspetto:</b> Transparente</p> <p><b>Cor:</b> Incolor</p> <p><b>Odor:</b> Característico</p> <p><b>pH:</b> [10,25 - 10,75]</p> <p><b>Densidade</b> a 20°C: 1,016 g/cm<sup>3</sup></p> <p><b>Propriedade de solubilidade:</b> Solúvel em água</p> <p><u>Substância ativa de acordo com anexo V Regulamento (UE) Nº 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas, "Tipo de Produtos Biocidas", pertencentes ao Tipo de Produto 2 – Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais e Tipo de Produto 4 - Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais.</u></p>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<p>Cloreto de didecildimetilamónio 2,475 %(m/m), excipientes qbp. 100%.</p>
<b>EMBALAGEM</b>	<p>5L, 20L</p>

## USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.

### ANEXO I

Ensaio de eficácia segundo as normas UNE-EN realizados em laboratório acreditado de desinfeção do fornecedor da substância ativa, os tempos de contacto apresentados são obrigatórios, de forma a garantir o efeito de desinfeção do produto:

**Tabela 1.** Ensaio de eficácia bactericida, condições sujas. Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1276 Ensaio em suspensão	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i>	5min	2,50%
EN 13697:2015 Ensaio em superfícies	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i>	5 min	5,00%
EN 13697:2015 Ensaio em superfícies	<i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella typhimurim</i>	5min	5,00%
EN 13697:2015 Ensaio em superfícies	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	15min	4,00%

**Tabela 2.** Ensaio de eficácia leveduricida, condições sujas. Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1650 Ensaio em suspensão	<i>Candida albicans</i>	15min	0,50%
EN 1650 Ensaio em suspensão	<i>Candida albicans</i>	15min	2,50%
EN 13697:2015 Ensaio em Superfícies	<i>Candida albicans</i>	5 e 15min	5,00%

**Tabela 3.** Ensaio de eficácia fungicida, condições sujas. Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1650 Ensaio em suspensão	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i>	15min	5,00%
EN 13697:2015 Ensaio em Superfícies	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i>	15min	15,00%

**Tabela 4.** Ensaio de eficácia virucida, condições sujas. Área Médica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 14476 Ensaio em suspensão	<i>Vaccinia virus Ankara</i> Atividade contra vírus com envelope	1min	2,50%